


LA COSCOJA



Es un arbusto que normalmente se piensa que es una carrasca por su parecido, ya que pertenecen a la misma familia, pero que no hay que confundir ya que se trata de otra especie, y cuyas diferencias notables con la encina es que el capuchón del fruto permanece en la mata una vez que la bellota ha caído y que dicho capuchón es pinchante, además de que no tiene un pie definido sino que desde la base hay una multitud de ramas que se entrelazan, que no deja de ver el tronco y lo hace impenetrable, por esto último es por lo que recibe también el nombre de maraña.

La coscoja (*Quercus coccifera*) es un arbusto perenne que no suele alcanzar los dos metros de altura, de ramas rígidas, densas con algo de pelosidad al principio, que sustenta a las hojas alternas, coriáceas oblongas o elípticas con espinas en el margen muy punzantes, de color verde oscuro por el haz excepto cuando son jóvenes que tienen un tono verde claro. Es una especie monoico, es decir que las flores masculinas y femeninas se encuentran en la misma planta. Las flores masculinas son muy pequeñas y las femeninas se encuentran normalmente solitarias o en grupos de dos o tres que al madurar dan las bellotas de un sabor amargo no muy apetecibles para su ingestión, que son oblongas con la cúpula recubierta de escamas rígidas y espinosas y que cubre la mitad del fruto.

La floración ocurre entre abril y mayo y el desarrollo del fruto el primer año es escaso y la maduración total de la bellota se produce entre agosto y octubre del segundo año. Brota vigorosamente de raíz y da brotes a lo largo de su vida, lo cual le confiere cualidades de resistencia al fuego, si bien la acción repetida de los fuegos puede causar su degeneración a comunidades de peor calidad. Y en caso de querer que germine de la semilla, ésta se tiene que plantar en otoño.

Esta mata o bien aparece aislada o puede encontrarse formando matorrales casi impenetrables, sustituye a la encina donde el terreno se ha degradado o donde la carrasca se encuentra en regresión, por lo que es frecuente en suelos de mala calidad, secos, pedregosos e incluso yesíferos, por lo que llegamos a la conclusión que no es exigente en cuanto al suelo aunque prefiere los calizos. El límite de altitud es de 1000 metros. Y es tolerante a la sequía y a las altas temperaturas por lo que en zona de montaña se le observa en la zona de solana.

En cuanto a sus usos, la bellota puede ser consumida por cabras y algunas variedades de cerdos, si bien son muy amargas y astringentes. Antiguamente tostadas se han utilizado para sustituir el café y picadas para enmascarar el adulteramiento de los vinos. La corteza es rica en taninos y se han usado para curtir. La madera es de buena calidad pero su escaso diámetro le da poco valor comercial por lo que es aprovechable únicamente para leña y carbón. Antaño tuvo importancia el uso de las agallas provocadas en las hojas por el hemíptero *Coccus ilicis* (cochinilla), obteniendo un colorante rojo, de aquí la procedencia de su nombre de coccifera. Pero quien de verdad se aprovecha de los coscojares es la caza menor (perdices, liebres, conejos...) ya que de ella obtiene un buen refugio.

J.J.R.R